

Las Muelas de Juicio



L

La mayoría de las personas comienzan a tener sus terceros molares (también llamados muelas del juicio) casi al final de sus diecinueve años de edad o al principio de sus veinte. En muchos casos, las mandíbulas no son lo suficientemente grandes para acomodar los dientes y éstos permanecen debajo de las encías (dientes impactados).

¿QUE ES UN DIENTE IMPACTADO?

Cuando un diente se desarrolla, se mueve hacia su posición apropiada en el arco dental. Si el curso de la salida a través de la encía es evitado debido al tamaño de la mandíbula, el diente estará parcial o totalmente cubierto (impactado).

¿CUAN SERIO ES UN DIENTE IMPACTADO?

Problemas serios pueden desarrollarse debido a un diente parcialmente cubierto o bloqueado, tales como infección y posible apinamiento y daño a los dientes adyacentes. Complicaciones más serias pueden desarrollarse cuando la bolsa que rodea al diente impactado se llena de líquido y se ensancha para formar un quiste que socaba la mandíbula y que da como resultado daño permanente de los dientes adyacentes, mandíbula y nervios.

Dejarlo sin tratamiento puede desarrollar un tumor de las paredes de estos quistes y se requerirá de un procedimiento quirúrgico más complicado para extirparlo.



¿DEBE SALIR EL DIENTE SI NO HA CAUSADO PROBLEMAS TODAVIA?

Nadie puede decirle cuando le causara problemas su muela impactada, pero los problemas surgiran. Cuando lo hagan, las circunstancias pueden ser mucho mas dolorosas y los dientes pueden ser mas complicados de tratar.

¿CUANDO DEBIERAN EXTRAERME MIS DIENTES IMPACTADOS?

La clave para la atencion a tiempo de los terceros molares es radiografiar la boca. Con la ayuda de estas radiografias, el cirujano oral y maxilofacial puede con frecuencia predecir si las muelas del juicio causaran problema, ya sea en un futuro cercano o mas tarde en el transcurso de la vida. De ser asi, existe la posibilidad de que su cirujano oral y maxilofacial le recomendara su extraccion en lugar de esperar a que surjan problemas.

La extraccion es facil en los pacientes mas jovenes. Las raices no estan totalmente desarrolladas y el hueso es menos denso. En otros pacientes, la extraccion antes que las complicaciones se desarrollen, es clave para una recuperacion y sanado mas breve y minimizar las molestias despues de la cirugia.

¿QUE OCURRE DESPUES DE LA CIRUGIA?

Por lo general, despues de la cirugia, el paciente experimenta alguna inflamacion y molestia. Sin embargo, con instrucciones personales post-operatorias y medicamentos, el cirujano oral y maxilofacial puede reducir adecuadamente las molestias posibles despues de la cirugia. ●



**Asociación Americana de
Cirujanos Orales y Maxilofaciales**

9700 W. Bryn Mawr Avenue
Rosemont, Illinois 60018-5701
847/678-6200 Fax: 847/678-6286
Website: www.aaoms.org

©2000 Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales
All rights reserved. Printed in the United States of America.
PS8 (5M/3.00)